

## GEBRAUCHSINFORMATION

Pulsatilla RemaVet Globuli für Tiere  
Homöopathisches Arzneimittel

**1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST**

Remedia Homöopathie Mag. pharm. Robert Müntz GmbH  
7000 Eisenstadt,  
Tel.: +43 2682 62220-66. Fax.: +43 2682 63919  
E-Mail.: hahnemann@remedia.at

**2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Pulsatilla RemaVet Globuli für Tiere

Homöopathische Arzneispezialität  
Weiße Streukügelchen (Globuli)

**3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

1 g Globuli (ca. 120 Globuli) enthält:

**Wirkstoff:**

Pulsatilla pratensis C200      10 mg

**Sonstige Bestandteile:**

Saccharose

**4. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneibildern ab. Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen (soweit auf die Zieltierart zutreffend):

- zur unterstützenden Behandlung bei Wehenschwäche
- Orchitis
- durch Angst beim Alleinsein ausgelöstes Fehlverhalten; Eifersucht
- Konjunktivitis; verklebte Augenlider; Entzündung der Atemwege, trockener Husten
- Entzündungen und Störungen der Verdauungsorgane; Durstlosigkeit
- zur unterstützenden Behandlung bei Kolik

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung. Bei schweren Formen dieser Erkrankung ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

**5. GEGENANZEIGEN**

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder Saccharose.

**6. NEBENWIRKUNGEN**

Keine bekannt.

Falls Sie Nebenwirkungen bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

**7. ZIELTIERART(EN)**

Rind, Pferd, Schaf, Ziege, Schwein, Kaninchen, Geflügel, Kleinnager, Hund, Katze.

**8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

Eine Einzeldosis entspricht 5-10 Globuli. Die Dosierung ist unabhängig davon, wie schwer oder groß das Tier ist.

Bei einer Einzeltierbehandlung empfiehlt sich das direkte Eingeben ins Maul, damit der Wirkstoff über die Mundschleimhaut aufgenommen wird.

Bei der Behandlung einer Gruppe von Tieren empfiehlt sich das Verabreichen über die Tränke. 20 Globuli in 1 Liter Wasser auflösen und in die Tränke geben.

Häufigkeit und Dauer der Anwendung:

Die Häufigkeit und Dauer der Anwendung richten sich in erster Linie nach den Grundsätzen der Homöopathie und dem vorliegenden Krankheitsbild.

Sollte nach 24 Stunden keine Besserung eintreten oder sich der Zustand weiter verschlimmern, sollte ein Tierarzt aufgesucht werden.

Am Beginn der Behandlung können mehrere Gaben in kurzen Abständen (15 min) je nach Schwere der Erkrankung verabreicht werden. Bei zunehmender Besserung wird 3-4-mal täglich eine Dosis über einige Tage verabreicht und schließlich seltener dosiert bzw. abgesetzt.

**9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**

Siehe unter Abschnitt Dosierung.

Bei Unklarheiten holen Sie bitte fachliche Beratung ein.

**10. WARTEZEIT(EN)**

Pferd, Rind, Schaf, Ziege, Schwein, Kaninchen, Geflügel:  
Essbares Gewebe: 0 Tage

Geflügel:  
Eier: 0 Tage

Pferd, Rind, Schaf, Ziege:  
Milch: 0 Tage

**11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25°C lagern. Behältnis fest verschlossen halten, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen. Nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder lagern (z.B. Fernseher, Computerbildschirme, Mikrowellenherde).

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf der Kennzeichnung angegebenen Ablaufdatum nicht mehr anwenden.

**12. BESONDERE WARNHINWEISE**

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Tierarzt kontrolliert werden.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Trächtigkeit, Laktation oder Legeperiode:

Für Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode halten sie bitte Rücksprache mit Ihrem Tierarzt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt geworden.

Wenn das homöopathische Tierarzneimittel gleichzeitig mit anderen Arzneimitteln angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt oder Apotheker.

**13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

**14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

November 2017

**15. WEITERE ANGABEN**

Z.Nr.: 838030

Apothekenpflichtig

Packungsgrößen: 10 g Globuli in Braunglasflaschen mit Dosiereinheit und Schraubverschluss aus Kunststoff